Lanzarta®

# HYLOBIUS FÜNF-SCHRITTE-PLAN FÜR IHREN WALD

01

## Risikobewertung des Standorts vor der Pflanzung

- Bisherige Hylobius-Aktivität.
- Zeitraum zwischen Fällung und Wiederbepflanzung.
- Gepflanzte Artenzusammensetzung.
- Lokales Wissen und Erfahrung.
- Die Lanzarta-Anwendung gegen die frühen Käferaktivität hilft, den Eiablagezyklus zu unterbrechen und potenziell weiteren Schädlingsdruck zu reduzieren.

02

## Behandlung in der Baumschule

- Zugelassene Insektizidanwendung mit präziser, geschlossener Spritzkammertechnologie in der Baumschule.
- Insektizidbehandlung vor der Pflanzung schützt Setzlinge vor anfänglichen Hylobius-Schäden in den entscheidenden frühen Phasen der Bestandesentwicklung.
- Die Baumschulbehandlung mit kontrollierter Anwendungstechnologie minimiert das Risiko von Einträgen in die Umwelt.
- Die Risikobewertung der Hylobius-Aktivität ermöglicht die präzise Festlegung von Zeitpunkt und Häufigkeit (ein oder zwei Anwendungen) für Nachpflanzungsbehandlungen im Wald.

03

## Schädlingsüberwachung nach der Pflanzung

- Larvenzählungen in Baumstümpfen im zeitigen Frühjahr.
- Beobachtung früher Hylobius-Schäden an Setzlingen entlang kürzlich gefällter Flächen.
- Fangen von erwachsenen Käfern im späten Frühling/Sommer (Monitoring).
- Überwachung von Schäden durch erwachsene Käfer in umliegenden Gebieten.

WeitereInformationenzuLanzartaerhaltenSievon:
**elvira.martin_de_la_higuera@syngenta.com**

syngenta

Turf & Landscape

## 04 Behandlung im Wald

- Die Lanzarta-Anwendung auf Setzlinge in den ersten Jahren nach der Pflanzung kann vor Schäden durch *Hylobius abietis* in den anfälligsten Wachstumsstadien und bei höchstem Schädlingsdruck schützen.
- Mischen Sie Lanzarta in der erforderlichen Konzentration von 30 ml pro 10 Liter sauberem Wasser. Punktuelle und präzise Behandlung mit 20 ml verdünntem Lanzarta Lösung pro Baum, um den unteren Hauptstamm bis zum Boden zu bedecken.
- Zielen Sie auf die Baumrinde, indem Sie die Setzlinge von der Seite besprühen Für eine optimale Benetzung von beiden Seiten sprühen, obwohl Versuche auch bei einseitiger Anwendung gute Ergebnisse zeigen.

| | Lanzarta | Wasservolumen | Anzahl der behandelten Bäume |
|---|---|---|---|
| Gepflanzte Bäume | 30 ml | 10 Litre | 500 |
| | 45 ml | 15 Litre | 750 |
| | 60 ml | 20 Litre | 1000 |

Lanzarta-Aufwandmenge bei Rückenspritze-Punktanwendung im Forst. Maximale Aufwandmenge von 180 ml/ha.

## 05 Gute forstwirtschaftliche Praxis

- Entwicklung integrierter Schädlingsmanagementstrategien, einschließlich Standortplanung und Artenauswahl.
- Nutzung von Brachflächenmanagement zur Reduzierung des Hylobius-Drucks.
- Management der Bodenvegetation.
- Umsetzung waldbaulicher Maßnahmen zur Stärkung der Schädlingsresistenz und des gesunden Wachstums.



LANZARTA® ist eine eingetragene Marke eines Unternehmens der Syngenta Group und enthält Chlorantraniliprol.
Produktinformationen erhalten Sie von elvira.martin_de_la_higuera@syngenta.com
Pflanzenschutzmittel sicher verwenden.
Lesen Sie vor Gebrauch stets das Etikett und die Produktinformationen.
DE. Pfl.Reg.Nr. 00B216-00.

Syngenta Agro GmbH.
Lindleystraße 8d
60314 Frankfurt am Main
Juli 2026.

syngenta

Turf & Landscape